

## Reprendre la campagne de vaccination



- Patients transplantés
- Entourage des patients (cocooning)
- Soignants



6 mois après le dernier rappel ou la dernière infection Covid-19 (envisageable dès 3 mois)



**Vaccin Pfizer monovalent Cominarty JN1 (30ug IM)**  
***A faire de préférence en même temps que le vaccin anti grippal (une dose dans chaque bras)***



Pas d'anticorps monoclonal disponible sur le marché efficace contre les variants circulants qui portent à ce jour très majoritairement la mutation de résistance F456L




- Maintien des gestes barrière
- Port du masque dans les lieux clos, les hôpitaux et les transports en commun



Encourager les patients à faire rapidement une PCR ou un test antigénique en cas de symptômes



Encourager les patients à prévenir rapidement leur centre de suivi en cas de positivité du test



## En cas d'infection Covid-19

En raison de l'absence de données confirmant l'efficacité du Paxlovid à l'ère Omicron chez les patients transplantés et des risques d'interactions médicamenteuses parfois sévères, l'utilisation de Paxlovid ne peut plus être recommandée de façon générale.

### Que faire en cas de frottis positif le jour de l'appel de greffe ?

- Si patient asymptomatique ou pauci-symptomatique en fin d'infection, sous réserve d'une imagerie pulmonaire rassurante
- **Transplantation autorisée (rein et foie)**